

# CHEMISEPT G COLOR

## VÄRVAINEGA NAHA ANTISEPTIKUM

CHEMISEPT G COLOR on alkoholi baasil värvainega vahend naha preoperatiivseks antiseptikaks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh.tuberkuuloositekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).



Tootes CHEMISEPT G COLOR on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiratoorsete allergooside teket. Peale naha antiseptikat jääb tänu tootes sisalduvale pikatoimelisele desinfektandile püsima kolmeks tunniks mikroobide elutegevuseks sobimatu keskkond. Toimeaja möödudes taastub kiiresti naha normaalne mikrofloora.

Toode on oranži värvi ja seetõttu on antiseptikumiga töödeldud nahapind hästi nähtav.

### KASUTAMINE:

#### •Preoperatiivne naha ettevalmistus:

Operatsiooni piirkond töödelda CHEMISEPT G COLOR -ga. Selleks kasutada korntange ja steriilset tampooni, mis immutatakse vahendiga ja kantakse nahale korralikult laiali hõõrudes. Operatsioonipiirkonna antiseptika viia läbi kaks korda, mõlemal korral toimeaeg 1,5 min. Lahuse toimeaeg naha preoperatiivseks ettevalmistamiseks kokku 3 minutit. Intsisioonikile võib kleepida ainult kuivale nahale.

Aseptilise operatsiooni korral alustada antiseptikat planeeritava löike piirkonnast, liikudes edasi perifeeria suunas.

Septilise operatsiooni korral alustada naha antiseptikaga perifeeriast, liikudes septilise piirkonna suunas.

---

Intraartikulaarse injektsiooni, punktsiooni, artroskoopia ja kanüleerimise eelne naha antiseptika:  
Niisutada süstimisriba või tampoon tootega ning töödelda nahka operatsiooniala piirkonnas,  
korrata toimingut teistkordselt uue tampooniga. Toimeaeg naha ettevalmistamiseks kokku 1 minut.

---

#### MIKROBIOLOOGIA:

Toimeajad on toodud nii väherasuse kui rasuse naha korral.

Mikroorganism	Kontsentratsioon	Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30sek
Staphylococcus aureus	lahjendamata	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrea	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
HBV	lahjendamata	30 sek
HIV	lahjendamata	30 sek
Adenoviirused	lahjendamata	30 sek
Herpes simplex	lahjendamata	30 sek.
Rota	lahjendamata	30 sek
Vaccina	lahjendamata	30 sek
BVDV	lahjendamata	30 sek
(surroogaarviiirus HCV määramiseks)		
Polyomavirus SV40	lahjendamata	5 min

---

Kuna CHEMISEPT G COLOR on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat), vaccinia, Adeno, Rota ja Herpes viirustele, inaktiveerib toode kõiki kapseldunud viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et CHEMISEPT G COLOR on efektiivne ka nn. verega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

---

**Toode vastab EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 12791 nõuetele.**

**Märkus:** tootega Chemisept G läbi viidud mikrobioloogilised testid laienevad ka tootele Chemisept G Color.

---

#### **ETTEVAATUSABINÕUD:**

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga! Ettevaatust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest.

Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

---

#### **KOOSTIS:**


100g toodet sisaldab: etanooli 75 g (toimeaine), kvaternaarsed amooniumühendid -benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides ja C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides 0,1g (toimeaine), värvaine.

Tootepakend on ümbertöödeldav.


#### **Biotsiidi registreerimistunnistus Nr 0046/05**

---


#### **PAKENDID:**



500ml dosaatorpudel  
korgiga



1000ml dosaatorpudel  
korgiga



5000ml kanister



AS Chemi-Pharm  
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti  
www.chemi-pharm.com  
chemi-pharm@chemi-pharm.com